

Tabla 2

La comparación de los resultados clínicos de nuestro estudio, con los resultados clínicos de los ensayos MARINA y ANCHOR y dos estudios retrospectivo llevados a cabo en otros países.

Resultados Clínicos	Ensayos Clínicos			Estudios Observacionales		Nuestro Estudio	
	MARINA (2006), Sham injection [25]	MARINA (2006), Ranibizuma b [25]	ANCHOR (2006), Ranibizuma b [28]	Cohen et. al (2009), Ranibizuma b [26]	Bandukwala (2010), Ranibizuma b [27]	Nuestro Estudio (2013). Bevacizumab [22]	Nuestro Estudio (2013) Ranibizumab [22]
Cambio medio en la agudeza visual desde el inicio hasta los 12 meses de seguimiento (número de letras)	-10,4	7,2	11,3	0,7	2,88	0,11	-8,87
Porcentaje de pacientes en cada grupo que perdieron menos de 15 letras ETDRS de agudeza visual a los 12 meses	62,20%	94,60%	96,40%	90,30%	82,00%	80,00%	56,00%
Porcentaje de pacientes en cada grupo que mejoraron en 15 o mas letras ETDRS de agudeza visual a los 12 meses	10,90%	33,80%	40,30%	8%	25%	18,00%	10,00%